

在华日资农药企业

农药产品真假识别方法 2022



前言

中国IPG (Intellectual Property Group in China;在华日资企业知识产权保护联盟) 农药工作小组所属的各家日资农药生产企业, 自上世纪八十年代年代初进入中国, 以各家公司自创的农药开发市场, 进行农药登记及其销售。长期以来, 由于各家公司的积极推广普及工作, 以及产品本身的卓越成效, 日资农药生产企业所提供的农药产品的商品名以及相应所注册的商标, 为中国广大农民所熟知热道, 成为本行业中的知名产品、品牌产品。同时, 这些农药, 严格遵循日欧美各国严格的农药登记的基本准则, 被确认对人畜以及生态环境是安全可靠的。

遗憾的是, 长期以来, 这些农药产品的商品名以及商标被不法分子盗用, 用相似的外包装, 或直接违法印制相同的外包装袋, 经营销售假冒伪劣农药产品。这些假冒伪劣产品在我国的广大农村的泛滥, 欺农坑农害农, 成为影响妨碍中国农业生产发展的一个重要因素。

中国IPG农药工作小组各家企业, 在中国以提供高产高质的农作物和坚持食品安全生产为宗旨, 致力于和中国各地各级政府部门协作, 积极参与农药生产销售领域中的打假树真活动。

制作本宣传手册目的是, 帮助各地各级政府执法部门, 在市场巡视及日常工作中尽早尽快准确地鉴定区别真伪产品。我们热忱的期望该手册, 在实际工作中对您的工作有所帮助。

中国IPG农药工作小组

2022年11月

婵贝® 400克/升 悬浮剂

杀菌剂

商标号：17049558

石原产业隆重推出
全新专利产品!



袋装规格：
15毫升/袋



瓶装规格：
25毫升/瓶、50毫升/瓶

肯佳® 400克/升 悬浮剂

杀菌剂

商标号：20387908



袋装规格：
10毫升/袋



瓶装规格：
100毫升/瓶

石原(上海)化学品有限公司

上海市长宁区延安西路2201号7楼713室 200336

TEL:021-61470920 FAX:021-61470920

科佳® 100克/升 悬浮剂

杀菌剂

商标号：1720574



袋装规格：

8毫升/袋×25袋、15毫升/袋×20袋



瓶装规格：

50毫升/瓶、200毫升/瓶、1000毫升/瓶

福帅得® 500克/升 悬浮剂

杀菌剂

商标号：3486801



袋装规格：

12毫升/袋×25袋



瓶装规格：

25毫升/瓶、200毫升/瓶、1000毫升/瓶

隆施® 10% 水分散粒剂

杀虫剂

商标号：1720575



袋装规格：
5克/袋×25袋
10克/袋×20袋
100克/袋

广钧® 24% 悬浮剂

杀虫剂

商标号：G975622



袋装规格：
5毫升/袋, 10毫升/袋

瓶装规格：
50毫升/瓶
100毫升/瓶
250毫升/瓶

铁臂® 22% 悬浮剂

杀虫剂

商标号：G919078



袋装规格：
10毫升/袋



瓶装规格：
50毫升/瓶



石原(上海)化学品有限公司
上海市长宁区延安西路2201号7楼713室 200336
TEL:021-61470920 FAX:021-61470920

抑太保® 50克/升 乳油

杀虫剂

商标号：3373156



袋装规格：

10毫升/袋×20袋

瓶装规格：

100毫升/瓶、250毫升/瓶、500毫升/瓶

福气多® 10% 颗粒剂

杀线虫剂

商标号：1720576



石原产业产品包装全新升级：产品包装使用货币防伪标识，正品防伪花纹清晰，纹理匀称。如果花纹模糊，纹理混乱，则可能为假货。

袋装规格：500克/袋、1千克/袋

玉农乐® 40克/升 可分散油悬浮剂

除草剂

商标号：5584989



瓶装规格：100毫升、250毫升



瓶盖上有 **ISK** 标志



铝箔封口上有 **ISK** 标志



瓶底有凸起“玉农乐”字样

精稳杀得® 150克/升 乳油

除草剂

商标号：1628517



货币花纹防伪



袋装规格：
15毫升/袋×30袋



瓶盖上有 **ISK** 标志



铝箔封口上
有 **精稳杀得** 标志



瓶底有凸起
“浙江石原金牛”字样

瓶装规格：
75毫升/瓶、90毫升/瓶、250毫升/瓶、500毫升/瓶

石原(上海)化学品有限公司

上海市长宁区延安西路2201号7楼713室 200336

TEL:021-61470920 FAX:021-61470920



组合化学

10%农美利 悬浮剂



每一袋均有13位激光唯一编码,使用标签上注明的IP,即:www.010gps.com.cn或标签上的查询电话均可查出其真实性。例1010000958680



90%禾草丹 乳油



10%必利必能 可湿性粉剂

扬州市苏灵农药化工有限公司分装的30克、40克规格产品



90%禾草丹 乳油

江苏省农垦生物化学有限公司分装的500克规格产品

SATURN®

产品性能 (用途):

本品是一种氨基甲酸酯类选择性内吸传导型土壤处理除草剂。可被杂草的根部和幼芽吸收。特别对幼芽吸收后转移到植物体内，对生长点有强烈的抑制作用。本品主要用于防治水稻田中一年生杂草。

使用技术和使用方法:

作物	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻秧田	一年生杂草	12% 1200g/亩 30% 2700g/亩	播

1) 本品最佳施用时期在水稻移栽后5-7天，孕穗2-3时期;
2) 施药前排干田水，药后1天回水，并保持3-5厘米深水层7天。

储存和运输:

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源热源。置于儿童触及不到之处，并加锁。勿与食品、饲料、饲料添加剂等混用。

农药登记证号: PD20160790
生产许可证号: 农药生许(苏)0079
产品标准号: HG/T 2214-2013

禾草丹

有效成分含量: 90%
剂型: 乳油

净含量: 500克

生产企业名称: 江苏省农垦生物化学有限公司
地址: 江苏省南京市江北新区长芦街道联泰10号
邮编: 210047 电话: 025-58392246
传真: 025-58392250 网址: www.suajam.com

有效期: 2年
生产日期及批号: 见包装

注意:

1. 本品每季最多使用1次，遇水田和不平整的田块不宜使用。
2. 施药时应穿长袖、戴手套、眼镜、口罩等防护用品，不能饮水、吸烟等。施药后，洗手并洗澡。
3. 远离水产养殖区、河塘等水体，禁止在鱼塘等水体清洗药具、鱼虾蟹等养殖品。
4. 用过的药瓶应妥善处理，不可随意丢弃，也不可随意丢弃。
5. 孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。

急救措施:

1. 不慎吸入，应将病人移至空气流通处。
2. 不慎接触皮肤或溅入眼睛，应用大量清水冲洗至少15分钟。
3. 误服应立即口服大量温开水并催吐，携此标签将病人送医院诊治。

原药提供企业名称: 日本组合化学工业株式会社

7-18055



94-Herakleitos-0004-02

日本组合化学工业株式会社

日本总社地址: 日本国东京都台东区池之端1-4-26

中国联系方式: TEL: 021-62787761 FAX: 021-62787763

生产日期自2018年以后的住友化学农药产品已启用了全新二维码包装,使用手机扫描二维码即可查询详细产品信息辨别真伪。



速克灵的云单页



来福禄的云单页

2018年产品标签根据我国法规更新了生产许可证号, 产品质量标准号。请用户根据以下指导判别标签信息。

购买产品时请认准标签左右上角处的住友化学注册商标和产品注册商标

速美克®

产品性能

本剂系日本住友化学株式会社发明的二甲基亚胺类新剂型杀菌剂。具有优良的预防和治疗作用, 对番茄、黄瓜、葡萄及葡萄具有有良好的防治效果。由于该产品不含有机溶剂, 减少了环境污染的影响, 同时提高了产品的品质。本剂系白色悬浮液, 易溶于水, 可配成不同倍数的乳液。

注意事项

要避免反复的连续使用, 可与作用方式不同的药剂轮换使用。药剂调配后, 要尽快使用, 不要长时间放置。不要和石灰或碱性剂、波尔多液等碱性药剂同时使用。遵守规定的剂量, 不应超量使用。一般情况下毒性很低, 但应注意不要吸吸。喷药后要洗手、戴手套、穿鞋等。注意不要将药液吸入口中或接触到皮肤上。喷药后要用肥皂洗手、脚和脸等皮肤暴露的地方洗净并漱口; 远离水产养殖用药, 禁止在河塘等水体中清洗施药器具; 避免药液污染水源地。用过的容器应妥善处理, 不可作他用, 也不可随意丢弃。孕妇及哺乳期妇女禁止接触。

中毒急救

经皮肤中毒立即用肥皂水冲洗皮肤, 并速携此标签就医诊治。如眼睛沾上药液, 应用足够的水连续冲洗 15 分钟, 必要时就医诊治。不吸烟。立即就医。不慎误服时, 速携此标签就医诊治。住友化学紧急援助咨询电话 NRCC: 0632-63886000 (24 小时)。

质量保证期: 2 年 原产地: 日本

腐霉利

43SC

有效成分含量: 43%

剂型: 悬浮剂

低毒

净含量: 1 千克

杀菌剂

住友®

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
番茄	灰霉病	100-130 毫升/亩	喷雾
黄瓜		75-100 毫升/亩	
葡萄		800-1200 倍液	

使用技术要求

使用前一定要仔细阅读该标签的注意事项。按量定用。加温水。使用时的药液浓度不可过低。有使用时的药液浓度在 100 倍以上, 保持使用频率。生长期使用。果实成熟后应继续使用。本药在田间使用时, 应遵守以下规定: 本药在葡萄上施用时的安全间隔期为 14 天, 在黄瓜上施用时的安全间隔期为 7 天, 每季最多施用次数为 2 次。在番茄上施用时的安全间隔期为 10 天, 每季最多施用次数为 2 次。

储存和运输

本品应存放在干燥、阴凉、通风、防雨处, 远离火源或热源。置于儿童触及不到之处, 并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品混贮。

农药登记证号: PD20151500 产品质量标准号: Q/SCCAF003-2021
近江农药生产许可证号: 农药生产(晋)0018

◆住友, 速美克为日本住友化学株式会社在中国的注册商标

生产日期、分装日期(批号): 见喷瓶 电子信息码:

分装厂: 广东嘉信生物科技有限公司
地址: 四会市江谷镇精细化工区创智 3 楼 5 号
电话: 0758-8512569 传真: 0758-8512569
邮编: 526000

二维码
区域
1.5x1.5cm

认准住友化学株式会社和联络处信息

表明登记证信息

扫描二维码可以查询住友化学产品信息

住友化学(上海)有限公司

上海市浦东南路528号证券大厦S2402-2403室 200120

TEL:021-68817700 FAX:021-68800188

住友化学商标标识






安达星® 33%安达星水分散粒剂



20克 (正面)



20克 (背面)

- ◆ 日产化学2015年新上市产品, 有20g铝箔袋装, 80g铝箔袋装。
- ◆ 采用数码防伪, 通过标签或外箱的防伪编码, 可以查询是否是假货。

日产化学制品(上海)有限公司

上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士T1办公楼3210单元

TEL:86-21-6236-8300*102 FAX:86-21-6236-8355

安稼星® 33%安稼星水分散粒剂



20g
正面



20g
北面

- ◆ 日产化学2015年上市产品安稼星的另一个品牌, 20g铝箔袋装。
- ◆ 采用数码防伪, 通过标签或外箱的防伪编码, 可以查询是否是假货。

草克星® 10%草克星可湿性粉剂



10g
正面



10g
背面

- ◆ 采用数码防伪, 通过标签或外箱的防伪编码, 可以查询是否假货。



精禾草克® 5%精禾草克乳油



2013年起,日产化学主要销售渠道的精禾草克(日产化学的注册商标)改为大口阻隔瓶,包装有100,200毫升和500毫升。

新包装采用数码防伪,通过标签或外箱的防伪编码,可以查询是否是假货。



2013年起,日产化学精禾草克的铝箔包装(20毫升)的标签作了相应的修改。

通过批号查询及防伪标贴识别是否是假货。

农易得® 农易得悬浮剂

240克/升



- ◆ 2021年新投入的满穗的另一个品牌,包装有10ml铝箔袋和1000ml瓶装。
- ◆ 采用数码防伪,通过标签或外箱的防伪编码,可以查询是否是假货。

日产化学制品(上海)有限公司

上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士T1办公楼3210单元

TEL:86-21-6236-8300*102 FAX:86-21-6236-8355

满穗® 满穗悬浮剂

240克/升



PULSOR®



10ml
正面




10ml
背面

◆ 铝箔袋、瓶子以及中盒、外箱均采用数码防伪, 通过物流数码, 可以查询是否假货。



满肃静® 30%满肃静悬浮剂



◆ 5ml铝箔袋装、100ml瓶装及1000ml瓶装, 通过批号, 可以查询是否假货。

日产化学制品(上海)有限公司

上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士T1办公楼3210单元

TEL:86-21-6236-8300*102 FAX:86-21-6236-8355

猎护® 30%猎护悬浮剂



- ◆ 日产化学2020年新上市产品, 有100ml瓶装, 500ml瓶装。
- ◆ 采用数码防伪, 通过标签或外箱的防伪编码, 可以查询是否假货。

施满特® 5%施满特悬浮剂



- ◆ 2021年秋季新上市日本农药株式会社的5%唑螨酯悬浮剂, 主包装为100ml瓶装。
- ◆ 采用数码防伪, 通过标签或外箱的防伪编码, 可以查询是否是假货。



70%可湿性粉剂



256322

0380 01 01

扫一扫二维码查询真伪



50%悬浮剂



916838071974

扫一扫二维码查询真伪





尼索朗®

5%可湿性粉剂/油剂



袋装:200克/袋



瓶装:200毫升/瓶

百可得®

40%可湿性粉剂



袋装:50克/袋



袋装:50克/袋

日曹达贸易(上海)有限公司


中国(上海)自由贸易试验区基隆路55号11层1112室 200131

TEL:021-64731277 FAX:021-64731322

富士一号 产品标签



江苏龙灯化学有限公司加工产品 500ml标签



中农立华生物科技股份有限公司加工产品 80ml标签



中农立华生物科技股份有限公司加工产品 500ml标签



富士一号 真伪辨别

中农立华生物科技股份有限公司生产

1 购买到产品后，查看标签上的物流码是否被破坏，物流码即是防伪码，可进行防伪查询。

2 拨通瓶身标签上的查询电话“4008859100”，按语音提示把16位防伪查询码输入后便知真假。



注：
正品富士一号标签
侧光会看到防伪底“”

(以上防伪查询方式
适合各种规格的富士一号)

江苏龙灯化学有限公司生产

ROTAM 富士一号®



① 瓶盖
② 瓶身
③ 瓶底
④ 标签
⑤ 二条线
⑥ 瓶底

种好稻 选好药 认准富士一号

控制区域	富士一号®	其他稻飞虱
① 瓶盖	瓶盖有“富士一号”字样，且瓶盖与瓶身连接处有“富士一号”字样。	瓶盖无“富士一号”字样，且瓶盖与瓶身连接处无“富士一号”字样。
② 瓶身	瓶身有“富士一号”字样，且瓶身与瓶底连接处有“富士一号”字样。	瓶身无“富士一号”字样，且瓶身与瓶底连接处无“富士一号”字样。
③ 瓶底	瓶底有“富士一号”字样，且瓶底与瓶身连接处有“富士一号”字样。	瓶底无“富士一号”字样，且瓶底与瓶身连接处无“富士一号”字样。
④ 标签	标签有“富士一号”字样，且标签与瓶身连接处有“富士一号”字样。	标签无“富士一号”字样，且标签与瓶身连接处无“富士一号”字样。
⑤ 二条线	瓶身有两条平行的“富士一号”字样，且两条“富士一号”字样之间有“富士一号”字样。	瓶身无两条平行的“富士一号”字样，且两条“富士一号”字样之间无“富士一号”字样。
⑥ 瓶底	瓶底有“富士一号”字样，且瓶底与瓶身连接处有“富士一号”字样。	瓶底无“富士一号”字样，且瓶底与瓶身连接处无“富士一号”字样。

以上这些不是富士一号

江苏龙灯化学有限公司
Jiangsu Longdeh Chemical Co., Ltd.

日农(上海)商贸有限公司

上海市延安西路2299号上海世贸商城1510室

TEL:021-62361901 FAX:021-62361900



垄歌

产品标签





氟酰胺

有效成分含量: 20%
剂型: 可湿性粉剂



使用方法和用法:

作物/病虫	防治对象	防治方法	防治次数
水稻	纹枯病	50-120克/亩	1次
花生	白粉病	75-120克/亩	1次
柑橘	白粉病	120-150克/亩	1次

注: ① 以上作物防治对象, 按有效成分计 1g。

② 以上施药浓度仅供参考, 使用时应根据当地病虫发生情况, 按 1000 倍以上的浓度进行防治。

③ 本品为低毒农药, 对鱼类、水生动物、蜜蜂、蚕等有毒, 使用时应严格遵守国家有关规定, 不得污染水源, 不得污染农作物, 不得污染人、畜、禽、鱼、蚕等。使用时应穿戴防护用品, 避免直接接触。使用后应妥善处理, 不得随意丢弃。

注意事项:

1. 本品为低毒农药, 对鱼类、水生动物、蜜蜂、蚕等有毒, 使用时应严格遵守国家有关规定, 不得污染水源, 不得污染农作物, 不得污染人、畜、禽、鱼、蚕等。使用时应穿戴防护用品, 避免直接接触。使用后应妥善处理, 不得随意丢弃。

2. 本品为低毒农药, 对鱼类、水生动物、蜜蜂、蚕等有毒, 使用时应严格遵守国家有关规定, 不得污染水源, 不得污染农作物, 不得污染人、畜、禽、鱼、蚕等。使用时应穿戴防护用品, 避免直接接触。使用后应妥善处理, 不得随意丢弃。

3. 本品为低毒农药, 对鱼类、水生动物、蜜蜂、蚕等有毒, 使用时应严格遵守国家有关规定, 不得污染水源, 不得污染农作物, 不得污染人、畜、禽、鱼、蚕等。使用时应穿戴防护用品, 避免直接接触。使用后应妥善处理, 不得随意丢弃。

包装规格:

20% 可湿性粉剂 100g/包, 250g/包, 500g/包, 1kg/包, 2kg/包, 5kg/包, 10kg/包, 20kg/包, 50kg/包, 100kg/包, 200kg/包, 500kg/包, 1000kg/包。

贮存和运输:

本品应存放在阴凉、干燥、通风处, 避免阳光直射。本品应远离火源、热源, 避免高温。本品应远离儿童、宠物、牲畜等。本品应远离水源, 避免污染。本品应远离农作物, 避免污染。本品应远离人、畜、禽、鱼、蚕等, 避免污染。

售后服务:

本公司提供完善的售后服务, 包括技术咨询、技术指导、技术培训等。本公司提供完善的售后服务, 包括技术咨询、技术指导、技术培训等。本公司提供完善的售后服务, 包括技术咨询、技术指导、技术培训等。

联系我们:

地址: 广东省广州市天河区... 电话: 020-12345678... 传真: 020-87654321... 网址: www.12345678.com

生产许可证: 粤药监证字[2015]第1234号

本公司生产的产品符合国家有关标准, 并经国家质量监督检验检疫总局认证。本公司生产的产品符合国家有关标准, 并经国家质量监督检验检疫总局认证。本公司生产的产品符合国家有关标准, 并经国家质量监督检验检疫总局认证。



[illegible]



优乐得®

噻嗪酮

有效成分含量: 25%
剂型: 可湿性粉剂

低毒

使用技术和使用方法

作物 (或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻	飞虱	20-30克/亩	喷雾
果树	茶小绿叶蝉	1333.3-2222.2倍液	喷雾
柑橘树	介壳虫	1000-1500倍液	喷雾
火龙果 (国蕉)	介壳虫	1000-1500倍液	喷雾

施用时期: 水稻飞虱、卵期或成虫1-2龄若虫期喷施; 茶小绿叶蝉、若虫盛口期相对较晚的嫩梢; 柑橘树头头蚜、若虫孵化初期喷施; 火龙果介壳虫、成虫孵化初期喷施。

安全间隔期: 茶树10天; 柑橘树35天; 水稻14天; 火龙果21天。每季最多使用2次; 茶树1次; 柑橘树2次; 水稻2次; 火龙果1次。

净含量: 500克

生产企业: 江苏龙灯化学有限公司
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

杀虫剂

优乐得®

产品性能 (用途)

- 噻嗪酮为新型昆虫生长抑制剂 (抑制蜕皮), 对咀嚼式害虫飞虱、茶小绿叶蝉、柑橘树头头蚜、火龙果介壳虫有优异的防治。

注意事项

- 药液不应直接喷向白蚁、萝卜、否则将引起根腐病及绿叶自化等药害。
- 使用时应先对水稀释后均匀喷雾, 不可用毒土法。
- 有毒昆虫, 应立即使用。
- 本品因无直接杀成虫的作用, 水稻在低龄若虫集中的时期, 柑桔在若虫发生初期, 茶在若虫发生初期使用较好。
- 本品对鱼类有毒, 应避免药液流入湖泊、河流或鱼塘中。清洗喷药器械或弃置废液时, 切勿污染水源。
- 使用前后下的药剂不可倒入水缸、湖泊、河流里。使此药剂的容器不能利用装其它东西, 需采取彻底清洗等方法, 加以妥善处理。
- 施药时应戴口罩、手套、穿防护服, 严禁吸烟和饮食, 不得逆风施药, 避免身体直接接触药液。施药后应彻底清洗裸露的皮肤和衣服。避免施及眼睛、皮肤和衣服。

中毒急救

- 中毒症状: 对人、畜毒性较低, 无全身中毒反应。
- 如药液溅到皮肤, 应立即用肥皂和水冲洗。
- 如药液溅到眼睛, 应用大量清水冲洗并请医生治疗。
- 误服中毒, 没有专门的解毒药。一旦发生事故, 立即催吐, 并送医院对症治疗。

储存和运输

- 产品应密封后存放在阴凉、干燥、通风处, 不要直接置于阳光下、远离火种、热源。
- 远离儿童, 不能与食品、饲料、粮食、饲料和种子等混合贮运。
- 远离儿童, 贮存在儿童接触不到的地方并加锁。
- 保持容器处于密封状态。

农药登记证号: PD03030798
农药生产许可证号: 农药生产 (苏) 0067
产品标准号: GB/T 29555-2009
质量标准: 三年 (有效期内) 自配
产品规格: 光二烯酮下规格
咨询电话: 400-828-8248
经销商: 请向当地经销商索取产品说明

生产日期及批号

生产企业: 江苏龙灯化学有限公司
JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
地址: 江苏省昆山市城北红塔路 88 号 电话: 0512-57711566
邮编: 215301 传真: 0512-57716696 网址: www.rotamchina.com

杀虫剂

日农(上海)商贸有限公司

上海市延安西路2299号上海世贸商城1510室

TEL:021-62361901 FAX:021-62361900

芙利亚®



扫二维码
查询真伪



艾翡特®



扫二维码
查询真伪



护瑞®



产品说明(中文): 护瑞® 是一种新型广谱杀虫剂，对蚜虫、粉虱、介壳虫、螨类等害虫具有优异的防治效果。本品为可溶粒剂，使用时兑水喷雾。本品对蜜蜂、蚕等有益生物安全。请严格按照说明使用。

防治对象	使用浓度	使用次数
蚜虫	10-20g/亩	1-2次
粉虱	10-20g/亩	1-2次
介壳虫	10-20g/亩	1-2次
螨类	10-20g/亩	1-2次

注意: 本品对蜜蜂、蚕等有益生物安全。使用时应避免直接接触。本品对水生生物安全。请勿在雨天使用。

扫二维码
查询真伪



爱利可多®



爱利可多® 是一种新型广谱杀虫剂，对蚜虫、粉虱、介壳虫、螨类等害虫具有优异的防治效果。本品为悬浮剂，使用时兑水喷雾。本品对蜜蜂、蚕等有益生物安全。请严格按照说明使用。

防治对象	使用浓度	使用次数
蚜虫	10-20g/亩	1-2次
粉虱	10-20g/亩	1-2次
介壳虫	10-20g/亩	1-2次
螨类	10-20g/亩	1-2次

注意: 本品对蜜蜂、蚕等有益生物安全。使用时应避免直接接触。本品对水生生物安全。请勿在雨天使用。

扫二维码
查询真伪



三井化学AGRO株式会社

日本总部地址: 东京都中央区日本桥一丁目 19-1

国内办事机构: 三井化学(中国)管理有限公司

TEL: 010-6590-9033 FAX: (86)(10)6590-9033

克必拿®



吡噻菌胺

有效成分含量: 20%

剂型: 悬浮剂

净含量: 100毫升

SIPCAM 三井化学

杀菌剂

农药登记证号: PQ20190054
农药生产许可证号: 农药生许(沪)10001
产品标准编号: QMCA-GR01F-2019


使用技术和使用方法

作物或防治对象: 梨树 梨黑星病 梨炭疽病
剂量: 1.5-2.5克/亩
施药方法: 喷雾
采收前: 1天
安全间隔期: 1500-3000天
详细内容见产品使用说明书

原产地: 日本
生产企业名称: 三井化学AGRO株式会社
国内办事机构: 三井化学(中国)管理有限公司
分设企业: 上海福至农业科技发展有限公司
质量保质期: 2年
生产日期: 见瓶盖
有效期至: 见瓶盖
批号: 见瓶盖



CN-mts2019054-100P-1







多来宝®



醚菊酯

有效成分含量: 10%

剂型: 悬浮剂

净含量: 100毫升

SIPCAM 三井化学

杀虫剂

农药登记证号: PD148-92
农药生产许可证号: 农药生许(沪)10001
产品标准编号: QMCA-GR01F-2017


使用技术和使用方法

作物或防治对象: 梨树 梨黑星病 梨炭疽病
剂量: 1.5-2.5克/亩
施药方法: 喷雾
采收前: 1天
安全间隔期: 1500-3000天
详细内容见产品使用说明书

原产地: 日本
生产企业名称: 三井化学AGRO株式会社
国内办事机构: 三井化学(中国)管理有限公司
分设企业: 上海福至农业科技发展有限公司
质量保质期: 2年
生产日期: 见瓶盖
有效期至: 见瓶盖
批号: 见瓶盖



CN-sppD149-92-100P-1



扫二维码
查询真伪

利来多®



惠光武士®



三井化学AGRO株式会社

日本总部地址: 东京都中央区日本桥一丁目 19-1

国内办事机构: 三井化学(中国)管理有限公司

TEL: 010-6590-9033 FAX: (86)(10)6590-9033

